



Mark-Tusindgylden (*Centaureum erythraea* var. *erythraea*)

Incl. Hoved-Tusindgylden (*centaurium erythraea* var. *capitatum*)

Nr. 1854



Voksesteder: Ret varierende og også på kulturpåvirket bund. Oftest på en let fugtig sandbund i klitlavninger, skrænter, overdrev, vejkanter m.m.

Trusler: Tilgroning.

Danmark: Spredt forekommende i hele landet undtagen Vestjylland, hvor den er sjælden.
Danmark ligger på artens nordgrænse.

Nordvestjylland: **TBU 1926 og DF 1981:** Kendt fra alle 5 distrikter.
Distr. 8: Seneste fund er 1989 på Feggeklit.
Distr. 9: Seneste fund er i 1988 ved Hjerk Nor.

Status i NV-jylland: Tilbagegang.

Bemærkninger: Inden for arten findes også underarten Hoved-Tusindgylden (*ssp. capitatum*). Kendskabet til dennes forekomst er manglende.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot.T. bd. 54, 1958.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
-	Opmærksomhedskrævende (X)	Mark-T.: Ikke bedømt (NE) Hoved-T.: Utilstrækkelige data (DD)	Opmærksomhedskrævende (X)