



Voksesteder: På en gerne ret næringsrig bund i skove, skovbryn, levende hegn, diger og krat m.m.

Danmark: Sjælden i Nord- og Vestjylland, men ellers almindelig i øvrige DK.

Nordvestjylland: **TBU 1926:** Kendt fra distr. 5 og 9.
DF 1981: Kendt fra distr. 5, 8 og 9.
Distr. 6: Ny for distriktet i 2011 ved Blovsgårde, Hjørdemål (HSØ).
Distr. 7: Ny for distriktet i ca. 1984 ved Tambohuse (P.O.Jensen og H.Bavnhøj).
Distr. 8: Seneste angivelse er ca. 1985 på Agerø (E.Wessberg).
Distr. 9: Seneste angivelse er fra 1994, men arten findes givetvis stadig flere steder i distriktet.

Status i NV-jylland: Uændret?

Bemærk: Planten er giftig, om end dens giftighed måske er noget overdrevet. Forgiftninger er dog iagttaget hos kvæg, ligesom planten kan give irritation af huden hos mennesker (NF og JCS, 2012).

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 47.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010	Regional Rød- og Gulliste for Nordvestjylland (foreløbig vurdering)
-	-	Ikke truet (LC)	Ikke truet