



Voksesteder: På fugtig, grundvandsnær og kalkrig tørvebund i klitlavninger og enge (ekstremrigkær) m.m.

Trusler: Tilgroning, grundvandssænkning m.m.

Danmark: Aftagende og i 2000 kun på 6 lokaliteter i Nordjylland samt 1 lokalitet på Fyn.  
Danmark ligger på artens nordgrænse.

Nordvestjylland: **TBU 1926:** Kendt fra distr. 6.  
**DF 1981:** Kendt fra distr. 6 og 9.  
**Distr. 5:** Ny for distriktet i 1986 på eng ved Bejstrup (URT 1986-4).  
Seneste herfra er 1987 (P.Wind, 1992).

Status i NV-jylland: Tilbagegang.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 47, 1943. - Naturnyt 3:1996 side 45-49.  
H.H.Wernberg, 2000: Sort Skænes autøkologi: Årsager til tilbagegang og mulighed for pleje.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
Sårbar (V)	Sjælden (R)	?	Sårbar (V) Regional ansvarsart (RA)