



Voksesteder: Ved kystnære vandløb, strandrørsumpe, tangvolde, ydre klitpartier m.m.

Danmark: Sjælden i landets østlige kystegne og meget sjælden mod vest. Forekomsterne i DK er dels hjemmehørende og dels indførte som forvildede fra haver. Danmark ligger ved artens sydgrænse.

Nordvestjylland: **TBU 1926:** Kendt fra distr. 6, 7 og 8.
DF 1981: Kendt fra distr. 5, 6, 7 og 8.
Distr. 9: Ny for distriktet i 1982 på Fur (Børge Larsen).

Status i NV-jylland: I fremgang.

Bemærkninger: Den anden underart af Kvan (*Fjeld-Kvan*, *Angelica archangelica* ssp. *archangelica*), dyrkes af og til i haver og er fundet forvildet på Læsø, i Østjylland og på Øerne. Saften fra planten kan i forbindelse med sollys give brandsårlignende vabler på huden.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 47.

| Rødliste 1990 | Rød- og Gulliste 1997 | Rødliste 2003 – 2010 | Regional Rød- og Gulliste for Nordvestjylland (foreløbig vurdering) |
|---------------|-----------------------|----------------------|---|
| - | - | Ikke truet (LC) | Ikke truet |