



Voksesteder: På fugtig bund i let skyggede skove eller på nordvendte skråninger. Dog oftest i udsivningszonen i skovgrøfter, hvor den gerne ses sammen med bl.a. Kambregne.

Trusler: Tilplantning, tilgroning og grundvandssænkning.

Danmark: Findes kun med ganske få forekomster udenfor Nordvestjylland.

Nordvestjylland: **TBU 1926:** Ingen angivelser fra området.
DF 1981: Kendt fra distr. 7.
Distr. 5: Ny for Nordvestjylland i 1926 i Langdalen (A.V.Henningsen).
Distr. 6: Ny for distriktet i 1991 i Vandet Pl. (HSØ) samt V.Thorup Pl. (HSØ).
Distr. 7: Ny for distriktet i 1950 ved Hvidbjerg Å (Herbariet, TBU).
Distr. 8: Ny for distriktet i 2010 ved Tæbring (HSØ).

Status i NV-jylland: Fremgang.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 49, 1953.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
Sårbar (V)	Sårbar (V)	Ikke truet (LC)	Ikke truet (LC)