



Voksesteder: På 1,5 – 2,5 meters dybde i rene, klarvandede søer.

Aktuelle trusler: Eutrofiering.

Danmark: Første fund i DK var i 1941 i Fiilsø, hvor den fandtes indtil 1947 (URT 1993:4). Eneste forekomst i DK er nu Nors Sø. Omfattet af habitatdirektivets bilag II og IV.

Nordvestjylland: **DF 1981:** Kendt fra distr. 6 (se nedenfor).
Distr. 6: Et tidligere formodet fund af arten i Lild Strandkær i 1961 har senere vist sig at være en atypisk form eller en anden najade-art. Nyfundet i Nors Sø i 1993, hvor den stadig findes. Nyfundet i Vandet Sø i 2002, hvor den imidlertid ikke er genfundet.

Bemærkninger: Planten er 1-årig og kan således være ustadig i sin forekomst. En tidligere antaget forekomst i Lild Strandkær fra 1961, har senere vist sig, at omfatte en anden udenlandsk art.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 70, 1976. - URT 1993:4 side 99-102. – P.Wind, 1999: Overvågning af rødlistede arter 1998.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
Forsvundet ? (Ex?)	Akut truet (E)	Moderat truet (EN)	Moderat truet (EN)