



Voksesteder: Kystnært på sandet bund bag de yderste klitrækker, ruderater, vejkanter m.m. samt på den øvre del af strandbredder.

Danmark: Første fund i Danmark er fra 1926 på Skallingen. Arten er måske indslæbt (fra USA), men nu fuldt naturaliseret. Findes med spredte forekomster langs Jyllands vestkyst fra Rømø til Skagen.

Nordvestjylland **NB:** Må betegnes som indslæbt til landsdelen.
DF 1981: Kendt fra distr. 7.
Distr. 7: Ny for distriktet og Nordvestjylland i 1956 på Agger Tange (Herbariet, TBU).
Distr. 9: Ny for distriktet i 2004 ved Lysen Bredning (J.Ribergaard).

Status i NV-jylland: Fremgang.

Bemærkninger: Måske opstået via krydsning og mutation af indførte arter fra Nordamerika, men nu fuldt naturaliseret.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 56, 1960.
 Naturnyt 3:2001 side 215-220.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
Sjælden (R)	-	Vurdering ikke mulig (NA)	Vurdering ikke mulig (NA)