



Voksesteder: Lysåbne, næringsrige og kølige vældmoser.

Trusler: Tilgroning, grundvandssænkning, gødskning, isolation m.m.

Danmark: Efter voldsom tilbagegang kendes arten omkring 1993 kun fra ca. 20 lokaliteter i DK. Disse er alle beliggende nordøstlige del af Jylland (Løjtnant og Worsøe 1993).  
Omfattet af habitatdirektivets bilag II og IV.  
Totalfredet i DK siden 1991.  
Tilbagegang.

Nordvestjylland: **TBU 1926:** Kendt fra distr. 5, 6? og 8.  
**DF 1981:** Ikke kendt fra området.  
**Distr. 7:** Eneste angivelse er fra Brokær i 1970'erne (E. Warncke).

Status i NV-jylland: Forsvundet.

Læs mere: URT 1978:3 side 85-89. + URT 1987-1 side 3-16.  
URT 1993:1 side 27-29. + Botanisk Tidsskrift bd. 43 (TBU-afhandling).

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010	Regional Rød- og Gulliste for Nordvestjylland (foreløbig vurdering)
Sårbar (V)	Sårbar (V)	Sårbar (VU)	Forsvundet