



Voksesteder: På ret varierende jordbund, men oftest på kulturpåvirkede arealer som vej- og grøftekanter, især i tilknytning til læhegn eller andre træbevoksninger. Desuden på god muldbund i løvskove.

Udbredelse i Danmark: Sjælden i vestlige halvdel af Jylland. Ret almindelig i det øvrige Jylland og på Øerne.

Udbredelse i NV-jylland: **TBU 1926:** Kendt fra distr. 9.
DF 1981: Kendt fra distr. 5 og 9.
Distr. 6: Ny for distr. 6 i 1990 ved Vesløs (ST).
Distr. 7: Ny for distr. 7 i 1997 ved Vang (HSØ).
Distr. 8: Ny for distr. 8 i 2008 ved Refshammer (Jens Møller).

Status NV-jylland: Fremgang. Især en betydelig spredning i Nordthy – Jammerbugt efter nyere indvandring. Synes derimod ikke at være under spredning i Salling, hvor den er kendt fra ældre tid.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. Tidsskrift bd. 54, 1958.
 Naturnyt 2007:3 side 180-182.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010	Regional Rød- og Gulliste for Nordvestjylland (foreløbig vurdering)
-	-	Ikke truet (LC)	Ikke truet