



Voksesteder: Kystnært på fugtig og næringsrig bund i lysåbne løvskove, på skrænter samt i væld m.m.

Trusler: Tilgroning.

Danmark: Blev først i 1966 erkendt som en særlig underart af vorterod (Lægaard 1966).
I Danmark hidtil kun fundet i det vestlige Limfjordsområde.

Nordvestjylland: **DF 1981:** Fundet i alle 5 distrikter.

Status i NV-jylland: Måske i fremgang, men kendskabet til dens tidligere forekomst er mangelfuldt.

Bemærkninger: Underarten blev først i 1966 adskilt fra Alm. Vorterod, hvorfra den kendes ved ikke at danne yngleknopper. Den har endvidere en noget senere afblomstring end Alm. Vorterod.
Dens forekomst i Danmark menes at være et levn fra landets varmetid under Ertebølletiden, inden der blev udviklet tæt skov.

Læs mere: Botanisk Tidsskrift bd. 61 side 295-297.
URT 1981:3 side 87-90.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
Sjælden (R)	Sjælden (R)	?	Sjælden (R)