



Voksesteder: På halvskygget, mager bund i nåleskove.

Trusler: Intensiv skovdrift samt tilgroning.

Danmark: Ny for Danmark i 1854 i Vinding Skov (B.T. bd. 47). Efterhånden fundet i de fleste egne af landet. I fremgang efter 1940 (URT 1990:2), men synes ustabil på mange voksesteder og er nu måske i tilbagegang. Artens hovedudbredelse ligger øst for Danmark.

Nordvestjylland: **TBU 1926:** Kendt fra distr. 6.
DF 1981: kendt fra distr. 5, 6, 7 og 8.
Distr. 5: Ny for distriktet i 1945 i Blokhush Plantage (B.T. bd. 47).
Distr. 6: Ny for distriktet i 1903 i Svinkløv (B.T. 1923-25).
Distr. 7: Ny for distriktet i 1937 i Hvidbjerg Plantage (A. Boisen, TBU arkivet).
Distr. 8: Forekomsten i Legind Bjerger er desværre gået tabt i 2011 pga. renafdrift af området.
Distr. 9: Sidste og eneste er i 1985 ved Knuden, Fur (Carl Nørgaard).

Status i NV-jylland: Fremgang.

Bemærkninger: De danske bevoksninger synes kun i ringe grad at sætte spiringsdygtige frø.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot.T. bd. 47, 1951. - Naturnyt 1:1991 side 104-106.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (nogle ikke vurderet)	Regional Rød- og Gulliste for Nordvestjylland (foreløbig vurdering)
Sjælden (R)	-	?	Ikke truet