



Nældesommerfugl (*Araschnia levana*)



Forekomster før 1995



Forekomster 1995 - 2011

Levesteder: Overvejende i skovområder, hvor den især ses i frodige og gerne fugtige lysninger og skovkanter. Endvidere i haver m.m.
Larvens foderplante: Stor Nælde.

Danmark: Første fund i DK fra 1881 på Lolland-Falster. Er nu ret almindelig på Sjælland. Siden 1940'erne under betydelig spredning på Øerne og i Østjylland. I dag kun manglende iagttagelser i dele af Nord- og Vestjylland.

Jammerbugt – Hanherr.: De første iagttagelser i 2010?
Thy – Thyholm: Set på Thyholm i 2011 (HHL).
Mors: Set ved Højris i 2011 (JKK).
Fur – Salling: Set i Eskær Skov i 2011 (HSØ).

Status i Nordvestjyll.: Tiltagende efter nyindvandring.

Flyvetid: 1. generation (en lys form) fra ca. 1. maj – midt i juni.
2. generation (en mørk form) fra ca. midt i juli – sidst i august.
En 3. generation kan forekomme (en blanding af 1. og 2. generation) i september måned.
Overvintrer som puppe.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2008	Beskyttelses-kategori fra 1 - 12 (1 = højeste)
-	-	Ikke truet (LC)	11