



## Skovrandøje (*Pararge aegeria*)



Forekomster før 1995



Forekomster 1995 - 2015

**Levesteder:** En udpræget skovart, hvor den især ses i små lysninger i såvel løvskov som nåleskov. Desuden i haver og andre områder med træbevoksninger.  
**Larvens foderplante:** Forskellige arter af græsser.

**Danmark:** Indvandrede til DK omkring 1890 (Lolland). Spredning til Sjælland og Østjylland i løbet af 1930'erne. Siden er spredningen fortsat til det meste af Jylland.

**Jammerbugt – Hanherr.:** Kendt fra ca. 1990.

**Thy – Thyholm:** Første? i Thy set i Sennels Plantage i 2008 (PHP).  
 Første på Thyholm set i Lyngs i 2012 (HHL).

**Mors:** Første set i Galtrup i 1980 (JKK).

**Fur – Salling:** Set på Kås allerede i 1963 (M.Stoltze, 1996).

**Status i Nordvestjyll.:** I fremgang efter nyere indvandring.

**Flyvetid:** Med 2 – 3 generationer kan flyvetiden strække sig fra omkring 1. maj – oktober.  
 Overvintrer som halvvoksen larve eller som puppe.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2008	Beskyttelses-kategori fra 1 - 12 (1 = højeste)
-	-	Ikke truet (LC)	11