


Sørgeskåbe (*Nymphalis antiopa*)



Levesteder: Oftest i fugtige skov- og moseområder med birk eller pil. Som omstrejfende kan den ses næsten overalt, herunder ofte i haver.
Larvens foderplanter: Birk, pil og elm.

Danmark: Hovedparten af forekomsterne skyldes tilflyvende individer fra Sverige og Østeuropa, med meget varierende hyppighed fra år til år, bl.a. med en stor tilflyvning i 1996. Dog også ynglende enkelte steder i DK, bl.a. på Læsø, Nordsjælland og Bornholm.

Nordvestjylland: Alle forekomster her i området må tilskrives tilflyvende individer, der kan optræde i varierende antal fra år til år og kan i nogle år helt udeblive. Største kendte forekomst i Nordvestjylland er fra Hjørdemål Klit med 10 – 12 ex, den 21-4-1996 (JKK).

Flyvetid: Én generation, der efter klækning ses flyvende fra slutningen af juli – hen i oktober. De overvintrende voksne sommerfugle flyver fra slutningen af marts - juni.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2008	Beskyttelses-kategori fra 1 - 12 (1 = højeste)
-	-	Ikke truet (LC)	12